

ФГДС ПОД НАРКОЗОМ

Подготовка

1. Накануне до 18:00 последний легкий ужин, исключить сырые овощи и фрукты, жаренные, молочные и газосодержащие продукты.
2. После ужина, вечером, воду пить можно, кушать нельзя.
3. Также необходимо вечером сократить курение, а утром полностью отказаться от сигарет.
4. Утром можно выпить небольшое количество воды.
5. Начиная с утра и до обследования нельзя принимать пищу - прийти натощак.
6. Будьте готовы к тому, что при обнаружении патологии врачу-эндоскописту понадобится сделать биопсию.
7. Рекомендуется прийти в футболке или в другой одежде с коротким рукавом.

Памятка

Для предотвращения осложнения во время анестезии вам нужно соблюдать следующие условия:

- не принимать пищу в течение 6 часов до анестезии;
- не пить любые напитки, включая воду, за 4-5 часов до анестезии;
- в течение суток до проведения анестезии не принимать алкоголь.

Если вы нарушили какое-либо из этих условий, анестезиолог вправе отказать в проведении анестезиологического пособия.

Обследование перед анестезией:

- общий анализ крови (включая тромбоциты) - действителен в течение 3 дней;
- глюкоза крови - анализ действителен в течение 3 дней;
- ЭКГ - действительно в течение 14 дней;
- осмотр терапевта.

При наличии тяжелой сопутствующей патологии дополнительные обследования могут обговариваться.

Обязательно сообщите анестезиологу, если:

- вы страдаете сахарным диабетом;
- у вас повышенное давление;
- вы страдаете ишемической болезнью сердца или переносили инфаркт миокарда;
- вы страдаете хроническими заболеваниями легких (пример, бронхиальная астма);
- в ближайшее время (две недели) вы переносили ОРВИ или грипп;
- вы постоянно принимаете любые лекарственные препараты (желательно составить их список с кратностью и дозами);
- вам уже делали анестезию и были какие-то осложнения.

Причины, исключающие проведение анестезии:

- нестабильность соматического состояния (декомпенсация хронических заболеваний);
- острые воспалительные или инфекционные заболевания;
- патологическое ожирение;
- отсутствие голодной паузы;
- наличие наркотической зависимости.

Желательно, чтобы кто-то из родственников сопровождал вас домой после проведения анестезии, особенно это важно для пожилых пациентов.

После анестезии в течение 12 часов нельзя:

- выполнять работы, связанные с необходимостью повышенной концентрации и внимания;
- управлять транспортным средством;
- принимать алкоголь.